

Composizione dei principali concimi organici

Concime organico	Rapidità di azione	Contenuto in elementi fertilizzanti (in kg per q.)		
		Azoto (N)	Anidride fosforica (P ₂ O ₅)	Ossido di Potassio (K ₂ O)
Letame bovino				
fresco	lenta	0,38	0,18	0,45
mediamente fermentato	media	0,45	0,25	0,55
molto fermentato	media	0,60	0,30	0,50
Letame di cavallo				
con lettiera , fermentato	media	0,58	0,28	0,53
Letame di pecora				
con lettiera	media	0,83	0,23	0,67
solo sterco senza lettiera	pronta	1,80	2,23	0,67
Letame di porcile	media	0,45	0,19	0,60
Pollina	pronta	2,27	1,48	0,85
Colaticcio di concimaia	pronta	0,15	0,01-0,30	0,05-0,50
Orine di bovini	pronta	0,10	0,10	0,06
Orine di cavallo	pronta	0,15	0,10	0,16
Cenere di legna	media	–	3,40	6,10
Foglie di alberi	lenta	0,50	0,10-0,27	0,13-0,40
Torba asciutta	lenta	0,64-2,50	0,09	0,08
Pannello di ricino	media	4,45-7,50	1,50-2,80	1,49
Vinaccie	lenta	0,80-1,80	0,25-0,43	0,20-1,60
Ritagli di unghia e corna	lenta	8,20-16,00	0,90	–
Ritagli di cuoio	lenta	2,50-9,00	0,10	–
Peli e crini	lenta	10,00-17,00	0,10-0,40	–
Scarti di lana	lenta	4,00-8,00	0,18	0,19
Piume e penne	lenta	8,00-17,00	–	–

Sangue secco	pronta	5,40-13,90	0,50-1,50	0,60-0,80
Borlanda liquida	pronta	3,00	0,20	6,00